

□ مراقبت های پرستاری و توجهات ویژه :

- (۱) تحریک مثانه ناشی از مصرف دارو را می توان بصورت علامتی با فنازوپیریدین، استامینوفن و پروپانتلین (مطابق دستور) درمان نمود.
- (۲) اگر بیمار بطور طولانی مدت، تحت درمان با کورتون، ضد سرطان ها ، رادیوتراپی قرار بگیرد مصرف این دارو ممنوع است.
- (۳) این دارو را نباید ۱۷ تزریق نمود.
- (۴) برای آماده سازی این فرآورده، از تکنیک استریل و زیر هود بیولوژیک استفاده شود.

◇ مصرف در شیر دهی و کودکان : با احتیاط مصرف شود.

⊠ آموزش به بیمار و خانواده :

- (۱) در صورت امکان، دارو باید برای مدت ۲ ساعت در مثانه بماند. در ساعت اول بیمار باید ۱۵ دقیقه در حالت خوابیده به شکم، ۱۵ دقیقه خوابیده به پشت، ۱۵ دقیقه خوابیده به هریک از پهلوها دراز بکشد و ساعت دوم در وضعیت نشسته باشد.
- (۲) در طی درمان با این دارو، زنان بیمار حامله نشوند.

BCNU (Carmustine)

بی سی ان یو- کارموستین

نام تجاری

به اطلاعات مربوط به کارموستین مراجعه شود

Beclomethasone Dipropionate

بکلومتازون دیپروپیونات

Beclate-Beclorino/Beclovent/Beconase.Becotide.Vancenase/Vanceril

نام تجاری

- ✓ رده بندی فارماکولوژیک : گلوکوکورتیکوئید
- ✓ رده بندی درمانی : ضد التهاب، ضد آسم
- ✓ رده بندی مصرف در حاملگی : گروه C

- △ اشکال دارویی موجود :
- * Nasal spray → 50 mcg/dose
- * Inhalation spray → 50 mcg/dose

⊖ **فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک :** مکانیسم اثر: اثر ضد التهابی: تحریک سنتر آنزیم های مورد نیاز جهت کاهش پاسخ التهابی نیمه عمر ۱۵ ساعت

مدت اثر	اوج اثر	شروع اثر	روش مصرف
ناشناخته	۱ تا ۴ هفته	چندین روز - چندین هفته	از طریق بینی - استنشاقی

⊖ اندیکاسیون های تجویز، راه مصرف، دوز اثر دارو :

- آسم وابسته به استروئید
بالغین: دو تا چهار استنشاق، سه یا چهار بار در روز (حداکثر ۲۰ استنشاق در روز) مصرف می شود.
- کودکان : سنین ۶ تا ۱۲ سال: یک تا دو استنشاق، سه یا چهار بار در روز (حداکثر ۱۰ استنشاق در روز) مصرف می شود.
- رینیت فصلی، جلوگیری از عود پولیپ بینی بعد از جراحی بالغین و کودکان بزرگتر از ۱۲ سال : یک اسپری در هر سوراخ بینی دو تا چهار بار در روز استفاده می شود دوز معمول روزانه ۳۶۶-۱۶۸ mcg است.
- کودکان سنین ۶ تا ۱۲ سال : یک اسپری در هر سوراخ بینی سه بار در روز تجویز می شود.

⊖ **کنترا اندیکاسیون :** حساسیت مفرط - اسم استاتوس

⊙ **موارد احتیاط :** مصرف کورتیکواستروئیدهای سیستمیک - بیماران مبتلا به سل - عفونت های باکتریال. ، قارچی و یا ویروسی دستگاه تنفس
 ⊕ **عارضه جانبی :**

CNS: سردرد

EENT: خشکی دهان، راش، گر گرفتگی، خشونت صدا، تحریک زبان و حلق، کاهش حس چشائی

Resp: برونکواسپاسم، ویزینگ

نکته : در صورتیکه ۳ هفته بعد از شروع درمان بهبودی حاصل نگردید و یا عفونت های دهانی ایجاد شد مصرف دارو را قطع نمائید.

⊕ **تداخلات دارویی :** (تداخل دارویی قابل توجهی گزارش نشده است)

□ **مراقبت های پرستاری و توجهات ویژه :**

- (۱) در بیمارانی که علاوه بر این برنکودیلاتور از سایر برنکودیلاتورها استفاده می نمایند این برنکودیلاتورها باید چندین دقیقه قبل از تجویز بکلومتازون مصرف نمائید.
- (۲) تجویز این دارو در بیمارانی که کورتیکواستروئیدهای سیستمیک مصرف می کنند باید با اختیار صورت گیرد.
- (۳) از تجویز دارو در کودکان زیر ۶ سال خودداری شود.
- (۴) دارو را باید در درجه حرارت $2-30^{\circ}C$ نگهداری نمود.

□ **مراقبت های پرستاری و توجهات ویژه :**

- (۱) بهبود عملکرد ریوی در خلال ۴-۱ هفته پس از شروع مصرف دارو ایجاد می گردد.
- (۲) مخاط دهان بیمار باید از نظر بروز عفونت با کاندیدا مورد بررسی قرار گیرد.
- (۳) پس از بهبود علائم باید میزان مصرف دارو را بتدریج کاهش داده و سپس قطع نمود.

◇ **مصرف در شیر دهی و کودکان :** فقط در صورت لزوم و با احتیاط مصرف شود.

⊗ **آموزش به بیمار و خانواده :**

- (۱) به بیمار آموزش داده شود که ابتدا اسپری را به خوبی تکان داده، لبها را کاملاً دور بخش دهانی آن کیپ نموده و طی نیمه دوم مرحله دم دارو را مصرف نماید و جهت اطمینان از پخش موثر دارو در راههای هوایی انتهایی تا مدتی دهان را بسته نگهدارد.
- (۲) به بیمار بیاموزید بین دو استنشاق حداقل یک دقیقه تأمل نماید حداقل روزی یکبار وسیله استنشاق را زیر جریان آب گرم بشوید.

Belladonna P.B

بلادونا پی. بی

Donatal

نام تجاری

✓ **رده بندی فارماکولوژیک :** ترکیب آلکالوئید بلادونا و باربیتورات

✓ **رده بندی درمانی :** آنتی کولینرژیک، تسکین بخش

✓ **رده بندی مصرف در حاملگی :** گروه D

△ **اشکال دارویی موجود :**

*

	Tablets	Elixir
Atropin Sulfat	19/4 mcg	19/4 mcg/5 ml
Hyoscine HBR	6/5 mcg	6/5 mcg/5 ml
Hyoscynaminesulfat	103/7 mcg	103/7 mcg/5 ml
Phenobarbital	16/2 mcg	16/2 mcg/5 ml